

## **Conseils après un traitement endodontique** **(traitement de racine)**

Chère patiente, Cher patient,

Vous venez de bénéficier d'un soin endodontique. Le traitement consiste à désinfecter la ou les racines de la dent concernée. Ce traitement se fait souvent parce que l'os autour de la dent est infecté ou enflammé. C'est pourquoi vous pouvez avoir des sensibilités durant les jours qui suivent.

1- Une sensibilité à la mastication peut se manifester. Il s'agit d'une réaction normale et transitoire qui ne doit pas vous inquiéter. Dans ce cas, vous pouvez prendre un antidouleur type paracétamol (sauf allergie).

2- Si dans les jours qui suivent votre gencive ou votre joue gonfle, il est important de nous contacter. Nous pourrions vous prescrire des antibiotiques, à préciser selon le cas.

3- Veuillez attendre que l'effet de l'anesthésie locale diminue ou disparaisse avant de manger (pour éviter de vous mordre les lèvres)

4- Il est important de ne pas rester longtemps avec l'obturation provisoire. Cette dernière doit être remplacée au plus vite par votre dentiste traitant de façon à ne pas compromettre la pérennité du traitement. Nous lui transmettrons, avec votre accord, les informations nécessaires.

5- En attendant de revoir votre dentiste, merci de surveiller l'état de votre pansement provisoire qui a pour rôle d'éviter une recontamination par la salive qui contient des bactéries.

Si l'obturation ou la couronne provisoire était perdue, il est urgent de la renouveler dans les plus brefs délais.