

## Blanchiment

### Instructions d'utilisation

- Appliquer le gel de blanchiment à l'aide de la seringue après s'être brossé les dents : appliquer une goutte de gel de blanchiment dans la gouttière au centre du « réservoir » créé.
- Poser les gouttières en bouche en s'assurant de répartir uniformément le gel sur toute la surface de la dent. Appuyer sur la gouttière avec les doigts.
- A l'aide d'une brosse à dent humide, chasser le produit en excès en brossant de la gouttière vers la gencive.
- Laisser reposer en bouche pendant 2 heures.
- Retirer les gouttières et rincer les dents uniquement avec de l'eau. Laver et brosser les gouttières, en prenant soin de ne jamais utiliser de dentifrice, ni d'eau très chaude (ce qui déformerait la gouttière).
- Effectuer le traitement 1 fois par jour, de préférence le soir avant de dormir.
- Appliquer jusqu'à ce que vous ayez épuisé toutes les seringues ou jusqu'à ce que vous ayez atteint la couleur désirée.

### Conseils d'utilisation

- Réduire au minimum la consommation de thé, café, vin rouge ainsi que de tous les autres aliments pouvant tacher l'émail des dents.
- Diminuer la durée et la fréquence des applications si les dents sont sensibles.
- Utiliser le dentifrice Elmex vert (sensitive) ou Sensodyne
- Toujours conserver les seringues de gel de blanchiment non utilisées au réfrigérateur.
- Lors d'une utilisation ultérieure, vérifier la date de péremption avant l'utilisation du gel de blanchiment.